

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

# MI TRATAMIENTO CON MAVIRET®

Todo lo importante sobre  
el medicamento y su uso.



abbvie

**MAVIRET®**   
Glecaprevir/Pibrentasvir



## MAVIRET® PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LA INFECCIÓN POR HEPATITIS C

**Con MAVIRET®, su médica o médico le ha recetado un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C, una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC).**

MAVIRET® está autorizado para el tratamiento de la infección aguda y crónica por hepatitis C. Se denomina hepatitis C aguda a la enfermedad durante los primeros seis meses tras el contagio con el virus. Si el virus permanece en el cuerpo después de estos seis meses, se habla de un curso crónico o de una hepatitis C crónica (a largo plazo). La infección puede curarse tanto en la fase aguda como en la crónica.



Para adultos, MAVIRET® está disponible en forma de comprimidos recubiertos con película. Para niños a partir de tres años, MAVIRET® está disponible en forma de granulado recubierto. Cada comprimido y los gránulos contienen como combinación de principios activos glecaprevir y pibrentasvir.



## MECANISMO DE ACCIÓN

MAVIRET® actúa directamente como antiviral (antiviral de acción directa, DAA) contra todos los tipos comunes de virus que pueden causar una infección por hepatitis C.

- Con sus principios activos, inhibe ciertas proteínas que el virus necesita para multiplicarse en el hígado.
- De este modo, ya no puede infectar nuevas células hepáticas.
- La infección se combate eficazmente y el virus de la hepatitis C se elimina por completo del cuerpo.



## EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios muy frecuentes de MAVIRET® son dolor de cabeza y cansancio.

- Póngase en contacto con su consulta médica o su farmacia si presenta molestias durante el tratamiento con MAVIRET®.
- También debe ponerse en contacto si nota cualquier otra anomalía relacionada con la toma de MAVIRET®.
- También puede notificar los efectos secundarios a través del sistema nacional de notificación para Alemania: **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn**



## INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

Las interacciones de MAVIRET® con otros medicamentos son poco frecuentes. Sin embargo, algunos medicamentos no deben utilizarse junto con MAVIRET®, o esto solo debe hacerse bajo supervisión médica.

**Por eso, antes de comenzar su tratamiento con MAVIRET®, informe a su médica o médico sobre qué medicamentos utiliza regularmente o de forma ocasional o ha utilizado recientemente.**

Indique también preparados de venta libre, como por ejemplo la hierba de San Juan. Para su médica o médico, esta información es importante para poder asesorarle correctamente.



## CONTROLES DE SANGRE

Por lo general, antes, durante y después de su tratamiento con MAVIRET® se le extrae sangre y las muestras se analizan en el laboratorio. En base a los resultados, su médica o médico puede:

- decidir si debe tomar el medicamento;
- determinar la duración individual del tratamiento;
- comprobar que ya no tiene partículas del virus de la hepatitis C en su organismo y que el tratamiento fue exitoso.



**Cuanto antes se detecte la infección, antes se podrán prevenir daños hepáticos mediante un tratamiento específico.**

## HEPATITIS C: GRACIAS A LAS TERAPIAS MODERNAS, TIENE CURA

La enfermedad infecciosa hepatitis C es causada por el VHC. El virus entra en el organismo a través del contacto con la sangre y se multiplica en las células del hígado. Sin tratamiento, la infección puede dañar gravemente este órgano durante el curso de la enfermedad.



### LA HEPATITIS C SE PUEDE CURAR

Hoy en día, con una terapia temprana y dirigida, la infección por hepatitis C se puede curar en más del 95 por ciento de los casos.

- El tratamiento suele durar solo 8 - 12 semanas.
- La terapia es bien tolerada y tiene pocos efectos secundarios.
- Para un tratamiento eficaz, solo es necesario tomar unos comprimidos diariamente.
- El consumo de alcohol, el uso de drogas o un tratamiento de sustitución no son un impedimento para la terapia.



### DETECTAR LA INFECCIÓN A TIEMPO

Los primeros síntomas de la hepatitis C suelen ser similares a los de la gripe. También puede aparecer dolor en la parte superior derecha del abdomen.

- Las personas que deseen saber si tienen una infección pueden hacerse la prueba del VHC, por ejemplo, en la consulta de medicina general, en la oficina de salud pública o en centros de asesoramiento.
- Las personas que estén aseguradas por el seguro médico legal y tengan 35 años o más pueden hacerse una prueba única de hepatitis C durante un chequeo general de salud (Check-up 35). Por lo general, los costes del chequeo de los 35 años los cubre el seguro médico.



## INDICACIONES SOBRE EL USO DE MAVIRET®

Para adultos y niños a partir de 12 años con un peso mínimo de 45 kg, se recomiendan como dosis diaria tres comprimidos de MAVIRET® con 100 mg de glecaprevir y 40 mg de pibrentasvir. Los tres comprimidos están en un blíster. Se toman juntos y constituyen una dosis diaria.



### DURACIÓN INDIVIDUAL DEL TRATAMIENTO

La duración del tratamiento con MAVIRET® será determinada por su médica o médico. Muchos pacientes toman el medicamento diariamente durante 8 semanas. Dependiendo de factores individuales, la terapia puede durar más tiempo.



### INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN

La administración correcta de MAVIRET® es importante para el éxito de su terapia. Por eso, tome el medicamento siempre tal y como se lo haya indicado su médica o médico. Además, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Tome durante toda la duración del tratamiento **regularmente una vez al día** tres comprimidos de MAVIRET® de un blíster. No deje de tomar la medicación ni un solo día.
- Tome los comprimidos de MAVIRET® **junto con una comida**. Así, su cuerpo puede absorber de manera óptima los principios activos. No importa cuánta grasa y calorías contenga la comida.
- Trague cada comprimido de MAVIRET® **entero, sin partir**. Si los comprimidos se parten, mastican, trituran o disuelven, esto puede afectar a la absorción de los principios activos y los niveles de MAVIRET® en su sangre.



### VÓMITOS DESPUÉS DE TOMAR MAVIRET®

Si tiene que vomitar después de tomar MAVIRET®, esto puede afectar a la cantidad de principios activos en su sangre y reducir el efecto del medicamento.

La necesidad de tomar otra dosis depende de si su organismo ha tenido suficiente tiempo para absorber los principios activos:

- Si en el momento del vómito han pasado tres horas o menos desde la última toma, tome una dosis adicional de tres comprimidos de MAVIRET®.
- Si han pasado más de tres horas desde la última toma, no necesita otra dosis. En ese caso, basta con que recuerde tomar la siguiente dosis habitual a la hora programada.



### DOSIS OLVIDADA

No tome **nunca una dosis doble** para compensar una dosis olvidada de MAVIRET®. Dependiendo de cuándo se dé cuenta de que ha omitido una dosis, deberá tomar la dosis olvidada o no:

- Si se da cuenta de que ha olvidado sus comprimidos dentro de las 18 horas después de la hora programada para la toma, tome la dosis inmediatamente. Luego, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si se da cuenta de que ha olvidado sus comprimidos 18 horas o más después de la hora programada para la toma, no tome la dosis. Tome la siguiente dosis programada a la hora habitual.



### HA TOMADO DEMASIADO

Póngase en contacto de inmediato con su consulta médica o acuda a un hospital si ha tomado más MAVIRET® de lo recomendado.

Lleve el envase del medicamento con usted. Así podrá mostrarle a la doctora o al doctor de qué medicamento se trata.



### CAPACIDAD PARA CONDUCIR

MAVIRET® no tiene ningún efecto o solo un efecto insignificante en la capacidad para participar de manera segura y responsable en el tráfico vial.

La capacidad para manejar maquinaria tampoco se ve afectada por el medicamento.



### ANTICONCEPCIÓN, EMBARAZO, LACTANCIA

Consulte a su médica o médico sobre anticoncepción, embarazo y lactancia antes de tomar MAVIRET®.

- Ciertos métodos anticonceptivos no deben utilizarse junto con MAVIRET®.
- No se conoce el efecto de MAVIRET® durante el embarazo. Por lo tanto, el medicamento no se recomienda para mujeres embarazadas.
- No se sabe si los principios activos del medicamento pasan a la leche materna.

**Informe de inmediato a su médica o médico si se queda embarazada durante el tratamiento con MAVIRET®.**



### CONSERVACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD

No existen normas específicas para la conservación de MAVIRET®.

No utilice el medicamento después de la fecha de caducidad. Esta fecha figura en el envase después de la indicación «CAD» («Verwendbar bis») y en cada blíster después de «EXP».



## MÁS INFORMACIÓN



### ACERCA DE MAVIRET®

Puede encontrar información sobre MAVIRET® 100 mg/40 mg comprimidos recubiertos para el tratamiento de la infección por hepatitis C en: [www.abbvie-care.de/maviret](http://www.abbvie-care.de/maviret)



Además, lea cuidadosamente el prospecto (información para el paciente) de su medicamento antes de tomar MAVIRET®.

Puede resolver preguntas específicas sobre la terapia con MAVIRET® en su consulta médica o en su farmacia.



### ACERCA DE LA HEPATITIS C



¿Cómo se contrae la hepatitis C? ¿A partir de cuándo es fiable una prueba de detección del virus? ¿Qué opciones terapéuticas existen y quién puede asesorar al respecto? En nuestra página web encontrará respuestas sobre la infección por hepatitis C: [www.abbvie-care.de/erkrankung/hepatitis-c](http://www.abbvie-care.de/erkrankung/hepatitis-c)

En la página también recibirá consejos para afrontar la enfermedad en la vida cotidiana y podrá descargar gratuitamente más folletos para pacientes sobre la hepatitis C.



### ¡BUSQUE APOYO!

No siempre resulta fácil hablar sobre la hepatitis C. Sin embargo, el apoyo y los consejos de otras personas pueden ser de gran ayuda para afrontar la enfermedad y el tratamiento.

En la sección «Vivir con hepatitis C» en [www.abbvie-care.de/hepatitis-c](http://www.abbvie-care.de/hepatitis-c) encontrará opciones de contacto para grupos de autoayuda y otras direcciones útiles.

## MIS NOTAS



**AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG**  
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden



natureOffice.gmbh/DE-077-926617

DE-MAVI-260059 Versión 07/26

### **Nota para el equipo médico:**

La entrega de materiales de MAVIRET® a pacientes solo está permitida legalmente en el momento de la prescripción.

**MAVIRET®**   
Glecaprevir/Pibrentasvir