

INFORMAZIONE DESTINATA AI PAZIENTI

LA MIA TERAPIA CON MAVIRET®

Tutto ciò che è importante sapere
sul farmaco e sul suo utilizzo.



abbvie

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir



MAVIRET® PER IL TRATTAMENTO MIRATO DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELL'EPATITE C

Il suo medico le ha prescritto MAVIRET®, un medicinale per il trattamento dell'epatite C, malattia infettiva del fegato causata dal virus dell'epatite C (HCV).

MAVIRET® è omologato per il trattamento dell'infezione acuta e cronica da epatite C. L'epatite C acuta è la fase della malattia che si manifesta nei primi sei mesi dopo il contagio con il virus. Se il virus permane nell'organismo anche dopo questi sei mesi, si parla di decorso cronico o di epatite C cronica (a lungo termine). L'infezione può essere curata sia nella fase acuta che in quella cronica.



Per gli adulti, MAVIRET® è disponibile sotto forma di compresse rivestite. Per i bambini a partire dai tre anni, MAVIRET® è disponibile sotto forma di granulato rivestito. Ogni compressa e il granulato contengono una combinazione dei principi attivi glecaprevir e pibrentasvir.



MODALITÀ D'AZIONE

MAVIRET® agisce come antivirale diretto (Direct-Acting Antiviral, DAA) contro tutti i tipi di virus comuni che possono causare un'infezione da epatite C.

- Grazie ai suoi principi attivi, inibisce specifiche proteine di cui il virus ha bisogno per potersi moltiplicare nel fegato.
- Non può quindi più infettare nuove cellule epatiche.
- L'infezione viene combattuta efficacemente, il virus dell'epatite C viene rimosso completamente dall'organismo.



EFFETTI COLLATERALI

Effetti collaterali molto comuni di MAVIRET® sono cefalea e stanchezza.

- Si rivolga al suo medico curante o alla sua farmacia se durante la terapia con MAVIRET® compaiono tali disturbi.
- Contatti il medico o la farmacia anche se nota altre anomalie associate all'assunzione di MAVIRET®.
- È possibile segnalare gli effetti collaterali anche tramite il sistema nazionale di segnalazione per la Germania: **Istituto federale per i medicinali e i dispositivi medici, dipartimento Farmacovigilanza, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn**



INTERAZIONI

Le interazioni di MAVIRET® con altri farmaci sono rare. Tuttavia, alcuni medicinali non devono essere assunti in concomitanza con MAVIRET® oppure lo possono essere solo sotto controllo medico.

Prima di iniziare il trattamento con MAVIRET®, informi il suo medico in merito ai farmaci che assume regolarmente o occasionalmente, oppure che ha assunto fino a poco tempo fa.

Indichi anche i prodotti acquistabili senza ricetta, come ad esempio l'iperico (erba di San Giovanni). Queste informazioni sono importanti per il suo medico al fine di poterle fornire una consulenza adeguata.



ESAMI DEL SANGUE

Prima, durante e dopo il trattamento con MAVIRET® le verrà in genere praticato un prelievo di sangue e il campione verrà analizzato in laboratorio. Sulla base dei risultati, il suo medico potrà

- decidere se è opportuno che lei assuma il farmaco;
- stabilire la durata individuale della terapia;
- dimostrare che nel suo organismo non sono più presenti particelle del virus dell'epatite C e che il trattamento ha avuto esito positivo.



Prima viene riconosciuto un contagio, maggiori sono le possibilità di prevenire danni al fegato grazie a un trattamento mirato.

EPATITE C: GUARIBILE GRAZIE ALLE MODERNE TERAPIE

L'epatite C è una malattia infettiva causata dall'HCV. Il virus penetra nell'organismo attraverso il contatto con il sangue e si moltiplica nelle cellule del fegato. Se non trattata, l'infezione può causare gravi danni all'organo con il progredire della malattia.



L'EPATITE C È GUARIBILE

Con una terapia precoce e mirata, oggi è possibile guarire dall'epatite C in oltre il 95 % dei casi.

- Il trattamento dura solitamente solo 8-12 settimane.
- La terapia è ben tollerata e ha pochi effetti collaterali.
- Per un trattamento efficace è sufficiente assumere le compresse una volta al giorno.
- Il consumo di alcol, l'uso di droghe o un trattamento sostitutivo costituiscono un impedimento alla terapia.



RICONOSCERE PRECOCEMENTE L'INFEZIONE

I primi sintomi dell'epatite C sono per lo più simili a quelli dell'influenza. Possono anche comparire dolori nella parte superiore destra dell'addome.

- Chi desidera sapere se ha contratto l'infezione può sottoporsi al test per l'HCV, ad esempio presso il medico di base, l'ufficio sanitario o i centri di consulenza.
- Chi dispone di un'assicurazione sanitaria pubblica e ha almeno 35 anni può sottoporsi, una tantum, al test per l'epatite C nell'ambito di uno screening sanitario generale (Check-up 35). Di norma, i costi del Check-up 35 sono coperti dalla cassa malattia.



AVVERTENZE PER L'USO DI MAVIRET®

Per gli adulti e i bambini a partire dai 12 anni con un peso corporeo di almeno 45 kg, si raccomanda l'assunzione giornaliera di tre compresse di MAVIRET® contenenti 100 mg di glecaprevir e 40 mg di pibrentasvir. Le tre compresse sono confezionate in un blister. Vanno assunte insieme come dose giornaliera.



DURATA DEL TRATTAMENTO INDIVIDUALE

La durata del trattamento con MAVIRET® viene stabilita dal suo medico. Molti pazienti assumono il medicinale quotidianamente per 8 settimane. A seconda dei fattori individuali, la terapia può anche durare più a lungo.



ISTRUZIONI PER L'ASSUNZIONE

La corretta assunzione di MAVIRET® è importante per l'efficacia della terapia. Assuma quindi il medicinale sempre come prescritto dal suo medico. Segua inoltre le seguenti indicazioni:

- Assuma per tutta la durata del trattamento **regolarmente una volta al giorno** tre compresse MAVIRET® da un blister. Non salti mai un giorno di assunzione.
- Assuma le compresse MAVIRET® **a stomaco pieno**. Il suo organismo potrà così assorbire i principi attivi in modo ottimale. La quantità di grassi e calorie contenuta nel cibo non ha importanza.
- Assuma MAVIRET® **deglutendo la compressa intera**. Se le compresse rivestite vengono spezzate, masticate, frantumate o disciolte, si può influenzare l'assorbimento dei principi attivi e quindi la quantità di MAVIRET® nel sangue.



VOMITO DOPO L'ASSUNZIONE

In caso di vomito dopo l'assunzione di MAVIRET®, la quantità di principi attivi nel sangue potrebbe ridursi, compromettendo l'efficacia del medicinale.

La necessità di assumere un'ulteriore dose dipende dal tempo che il suo organismo ha avuto per assorbire i principi attivi:

- Assuma tre compresse di MAVIRET® come dose supplementare se dall'ultima assunzione al momento del vomito sono trascorse **tre ore o meno**.
- Non è necessaria un'ulteriore dose se dall'ultima assunzione **sono trascorse più di tre ore**. In questo caso, basta ricordarsi di assumere la dose successiva all'orario abituale.



DOSE DIMENTICATA

Non prenda **mai una quantità doppia** per compensare una dose di MAVIRET® dimenticata. La necessità di recuperare la dose dipende da quando si accorge di averla saltata:

- **Recuperi** la dose **immediatamente** se si accorge di aver dimenticato le compresse **entro 18 ore** dall'orario previsto per l'assunzione. La dose successiva la prenda nuovamente all'orario abituale.
- **Non recuperi** la dose **se si accorge di aver dimenticato le compresse 18 ore o più** dopo l'ora prevista per l'assunzione. Assuma la dose successiva regolarmente prevista all'orario abituale.



ASSUNZIONE ECCESSIVA

Si rivolga immediatamente al suo medico o si rechi in un ospedale se ha assunto una dose di MAVIRET® superiore a quella raccomandata.

Porti con sé la confezione del medicinale. In questo modo potrà mostrare al medico di quale medicinale si tratta.



IDONEITÀ ALLA GUIDA

MAVIRET® non ha effetti o ha effetti trascurabili sulla capacità di guidare veicoli in modo sicuro e responsabile.

Anche la capacità di utilizzare macchinari non viene compromessa dal medicinale.



CONTRACCZIONE, GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO

Prima di assumere MAVIRET®, consulti il medico riguardo alla contraccezione, alla gravidanza e all'allattamento.

- Alcuni contraccettivi non devono essere utilizzati in concomitanza con MAVIRET®.
- L'effetto di MAVIRET® durante la gravidanza non è noto. Il medicinale non è quindi raccomandato per le donne in gravidanza.
- Non è noto se i principi attivi del medicinale passino nel latte materno.

Informi immediatamente il suo medico se rimane incinta durante il trattamento con MAVIRET®.



CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA

Non esistono regole particolari per la conservazione di MAVIRET®.

Non utilizzi più il medicinale dopo la data di scadenza. Questa data è indicata sulla confezione dopo la dicitura "Da consumarsi entro" ("Verwendbar bis") e su ogni blister dopo la sigla "EXP".



ULTERIORI INFORMAZIONI



INFORMAZIONI SU MAVIRET®

Per ulteriori informazioni sulle compresse rivestite con film MAVIRET® 100 mg/40 mg per il trattamento dell'infezione da epatite C, consulti anche il sito: www.abbvie-care.de/maviret



Legga inoltre attentamente il foglietto illustrativo (accluso alla confezione) prima di assumere MAVIRET®.

Per le domande individuali sulla terapia con MAVIRET®, si rivolga al suo medico o alla farmacia.



INFORMAZIONI SULL'EPATITE C



Come si può contrarre l'epatite C? Da quando un test virale è attendibile? Quali opzioni terapeutiche esistono e chi può fornire consulenza in merito? Le risposte sono disponibili sul nostro sito web dedicato all'infezione da epatite C: www.abbvie-care.de/erkrankung/hepatitis-c

Sul sito è possibile trovare anche consigli su come gestire la malattia nella vita quotidiana e scaricare gratuitamente ulteriori opuscoli informativi sull'epatite C destinati ai pazienti.



SI FACCIA AIUTARE!

Parlare di epatite C non è sempre facile. Tuttavia, il sostegno e i consigli di altre persone possono essere molto utili per affrontare la malattia e la terapia.

Nella sezione "Convivere con l'epatite C" su www.abbvie-care.de/hepatitis-c trova possibilità di contatto con gruppi di autoaiuto e altri indirizzi utili.

LE MIE ANNOTAZIONI

Blank lined area for notes on page 14.

Blank lined area for notes on page 15.



AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden



natureOffice.gmbh/DE-077-926617

DE-MAVI-260060 Aggiornamento 07/26

Avvertenza per il team medico:

La consegna di materiale MAVIRET® ai pazienti è legalmente consentita solo al momento della prescrizione.

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir