

INFORMACJA DLA PACJENTA

MOJA TERAPIA LEKIEM MAVIRET®

Wszystko, co ważne o leku
i jego stosowaniu.



abbvie

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir



MAVIRET® DO CELOWANEGO LECZENIA WZW TYPU C

Twoja lekarka lub lekarz przepisał Ci MAVIRET® do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C – choroby zakaźnej, która atakuje wątrobę i jest wywoływana przez wirus HCV (wirus zapalenia wątroby typu C).

MAVIRET® jest dopuszczony do leczenia ostrej i przewlekłej postaci zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Ostra postać zakażenia wirusem HCV to faza choroby obejmująca okres pierwszych sześciu miesięcy po zakażeniu wirusem. Jeśli wirus pozostaje w organizmie po upływie tych sześciu miesięcy, mówimy o przewlekłej postaci choroby, czyli przewlekłym długotrwałym zapaleniu wątroby typu C. Zakażenie można leczyć zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej.



Dla dorosłych MAVIRET® jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Dla dzieci od trzeciego roku życia MAVIRET® jest dostępny w postaci granulatu powlekanego. Każda tabletki i granulatu zawierają dwie połączone substancje czynne: glekaprewir i pibrentaswir.



MECHANIZM DZIAŁANIA

MAVIRET® to bezpośrednio działający lek przeciwwirusowy (Direct-Acting Antiviral, DAA) aktywny wobec wszystkich głównych genotypów wirusa, które mogą wywołać zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C.

- Dzięki zawartym substancjom czynnym hamuje określone białka (proteiny) niezbędne do namnażania wirusa w wątrobie.
- W ten sposób wirus traci zdolność atakowania nowych komórek wątroby.
- Zwalczanie infekcji staje się skuteczne, a wirus zapalenia wątroby typu C zostaje całkowicie usunięty z organizmu.



DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo częste działania niepożądane leku MAVIRET® to bóle głowy i zmęczenie.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości podczas terapii lekiem MAVIRET®, prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą.
- Prosimy również o kontakt, jeśli zauważysz u siebie inne niepokojące objawy związane ze stosowaniem leku MAVIRET®.
- Działania niepożądane możesz zgłaszać również bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania dla Niemiec: **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn**



INTERAKCJE

Interakcje MAVIRET® z innymi lekami występują rzadko. Jednak niektórych leków nie można stosować razem z lekiem MAVIRET® lub ich stosowanie równoległe z lekiem MAVIRET® wymaga nadzoru lekarza.

Dlatego przed rozpoczęciem terapii lekiem MAVIRET® poinformuj lekarza o wszystkich lekach, które przyjmujesz regularnie lub okresowo, a także o tych przyjmowanych do niedawna.

Poinformuj również o preparatach dostępnych bez recepty, takich jak na przykład dziurawiec zwyczajny. Informacje te są ważne dla lekarza, aby mógł udzielić właściwej porady.



BADANIA KRWI

Z reguły przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu leczenia lekiem MAVIRET® pobierana jest krew pacjenta, a jej próbki są analizowane w laboratorium. Na podstawie uzyskanych wyników lekarz prowadzący

- decyduje, czy możesz przyjmować lek;
- ustala indywidualny czas leczenia;
- potwierdza, że wirus HCV nie występuje już w Twoim organizmie i że leczenie zakończyło się sukcesem.



Im szybciej zakażenie zostanie wykryte, tym wcześniej można rozpocząć terapię celowaną i zapobiec uszkodzeniom wątroby.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C: WYLECZALNE DZIĘKI NOWOCZESNYM METODOM LECZENIA

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C to choroba zakaźna wywoływana przez wirus HCV. Wirus przedostaje się do organizmu przez kontakt z zakażoną krwią i namnaża się w komórkach wątroby. Nieleczona infekcja może stopniowo prowadzić do poważnego uszkodzenia tego narządu.



WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C MOŻNA WYLECZYĆ

Dzięki wczesnej i celowanej terapii zakażenie HCV jest dziś wyleczalne w ponad 95% przypadków.

- Zazwyczaj leczenie trwa tylko 8–12 tygodni.
- Terapia jest dobrze tolerowana, a działania niepożądane są rzadkie.
- Do skutecznego leczenia wystarczy codzienne przyjmowanie tabletek.
- Spożywanie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych lub leczenie substytucyjne nie stanowią przeciwwskazania do podjęcia terapii.



WCZESNE ROZPOZNANIE ZAKAŻENIA

Pierwsze objawy zakażenia HCV są zazwyczaj podobne do grypy. Mogą również pojawić się bóle brzucha po prawej stronie w okolicy podżebrza.

- Kto chce sprawdzić, czy nie został zakażony, może udać się np. do lekarza rodzinnego, punktów diagnostycznych lub odpowiedniej poradni, aby wykonać test na obecność wirusa HCV.
- Osoby objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które ukończyły 35 lat, mogą jednorazowo poddać się badaniu na obecność wirusa HCV w ramach ogólnego programu badań profilaktycznych (Check-up 35). Koszty badania profilaktycznego Check-up 35 są zazwyczaj pokrywane przez kasę chorych.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA LEKU MAVIRET®

Osobom dorosłym oraz dzieciom w wieku powyżej 12 lat o masie ciała co najmniej 45 kg zaleca się przyjmowanie trzech tabletek leku MAVIRET® dziennie, zawierających 100 mg glekaprewiru i 40 mg pibrentaswiru. Trzy tabletki w jednym blisterze stanowią dawkę dobową. Należy je przyjmować jednocześnie raz na dobę.



INDYWIDUALNY CZAS TRWANIA LECZENIA

O czasie trwania terapii MAVIRET® decyduje lekarz prowadzący. Wielu pacjentów przyjmuje lek codziennie przez 8 tygodni. W zależności od indywidualnych czynników terapia może trwać dłużej.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA

Prawidłowe przyjmowanie MAVIRET® jest ważne dla skuteczności Twojej terapii. Dlatego zawsze przyjmuj lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Zwróć także uwagę na poniższe wskazówki:

- Przez cały okres leczenia **regularnie raz dziennie** przyjmuj trzy tabletki MAVIRET® z jednego blistra. Nie pomijaj żadnego dnia w trakcie przyjmowania leku.
- Tabletki MAVIRET® należy przyjmować **razem z posiłkiem**. W ten sposób organizm może optymalnie wchłonąć substancje czynne. Nie ma znaczenia, ile tłuszczu i kalorii zawiera posiłek.
- MAVIRET® należy **połykać w całości**. Jeśli tabletki powlekane zostaną rozłamane, przeżute, rogniecione lub rozpuszczone, może to wpłynąć na wchłanianie substancji czynnych i stężenie leku MAVIRET® we krwi.



WYMIOTY PO PRZYJĘCIU LEKU

Jeśli po przyjęciu leku MAVIRET® wystąpią wymioty, może to wpłynąć na ilość substancji czynnych we krwi i osłabić działanie leku.

Ewentualne przyjęcie jeszcze jednej dawki zależy od tego, czy organizm miał wystarczająco dużo czasu na wchłonięcie substancji czynnych:

- Przyjmij trzy tabletki MAVIRET® jako jeszcze jedną dawkę, jeśli wymioty wystąpią **do trzech godzin** po ostatnim przyjęciu leku.
- Nie potrzebujesz jeszcze jednej dawki, jeśli od ostatniego przyjęcia leku upłynęło **powyżej trzech godzin**. Wystarczy, jeśli o zwykłej porze przyjmiesz swoją kolejną regularną dawkę.



POMINIĘCIE DAWKI

Nigdy nie należy przyjmować podwójnej ilości w celu uzupełnienia pominiętej dawki MAVIRET®. Uzupełniające przyjęcie pominiętej dawki zależy od tego, kiedy zauważysz jej pominięcie:

- **Zażyj dawkę jak najszybciej**, jeśli **w ciągu 18 godzin** od planowanego przyjęcia zauważysz fakt pominięcia tabletek. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.
- **Nie zażywaj dawki po upływie 18 godzin lub później** od planowanego przyjęcia, jeśli dopiero wtedy zauważysz fakt pominięcia tabletek. Kolejną dawkę przyjmij dopiero o swojej zwykłej porze.



PRZEDAWKOWANIE

Niezwłocznie skontaktuj się ze swoją przychodnią lekarską lub udaj się do szpitala po przyjęciu leku MAVIRET® w nadmiernej ilości, powyżej zalecanej dawki.

Zabierz ze sobą opakowanie leku. Dzięki temu możesz pokazać lekarzowi, jaki lek przedawkowano.



WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW

MAVIRET® nie ma żadnego wpływu lub ma znikomy wpływ na zdolność do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Również zdolność do obsługiwanie maszyn nie jest ograniczona przez lek.



ANTYKONCEPCJA, CIĄŻA, KARMIENIE PIERSIĄ

Przed zastosowaniem leku MAVIRET® skonsultuj się z lekarzem w kwestii antykoncepcji, ciąży i karmienia piersią.

- Niektórych środków antykoncepcyjnych nie wolno stosować jednocześnie z lekiem MAVIRET®.
- Wpływ leku MAVIRET® stosowanego podczas ciąży nie jest znany. Dlatego lek ten nie jest zalecany dla kobiet w ciąży.
- Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w leku przenikają do mleka matki.

W przypadku zajścia w ciążę podczas terapii lekiem MAVIRET® należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego.



PRZECHOWYWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Nie obowiązują żadne szczególne wymagania dotyczące przechowywania leku MAVIRET®.

Nie należy stosować leku po upływie daty ważności. Data ta znajduje się na opakowaniu za adnotacją „Należy zużyć do” („Verwendbar bis“) oraz na każdym blistrze za oznaczeniem „EXP”.



DODATKOWE INFORMACJE



INFORMACJE O LEKU MAVIRET®

Informacje dotyczące leku: MAVIRET® 100 mg/40 mg tabletki powlekane, stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, znajdziesz także na stronie: www.abbvie-care.de/maviret



Przed zastosowaniem leku MAVIRET® należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące leku MAVIRET® można uzyskać w przychodni lekarskiej lub w aptece.



INFORMACJE O WIRUSOWYM ZAPALENIU WĄTROBY TYPU C



Jak mogę zarazić się wirusem HCV? Kiedy wykonać test na obecność wirusa, aby był miarodajny? Jakie są opcje terapii i kto może udzielić porady w tym zakresie? Odpowiedzi znajdziesz na naszej stronie internetowej poświęconej zakażeniu wirusem HCV:

www.abbvie-care.de/erkrankung/hepatitis-c

Na stronie znajdziesz także wskazówki dotyczące codziennego radzenia sobie z chorobą oraz bezpłatne broszury dla pacjentów dotyczące WZW C.



POSZUKAJ WSPARCIA!

Rozmowa o wirusowym zapaleniu wątroby typu C nie zawsze jest łatwa. Wsparcie i rady od innych osób mogą być jednak bardzo pomocne w radzeniu sobie z chorobą i w trakcie terapii.

W zakładce „Życie z wirusowym zapaleniem wątroby typu C” na stronie www.abbvie-care.de/hepatitis-c znajdziesz możliwości kontaktu z grupami samopomocy oraz inne przydatne adresy.

MOJE NOTATKI



AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden



natureOffice.gmbh/DE-077-926617

DE-MAVI-260061 Stan 07/26

Informacja dla zespołu medycznego:

Wydawanie pacjentom materiałów dotyczących leku MAVIRET®
jest prawnie dozwolone dopiero w momencie wystawienia recepty.

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir