

PROSPECT INFORMATIV PENTRU PACIENȚI

TERAPIA MEA CU MAVIRET®

Toate informațiile importante despre
medicament și modul de administrare.



abbvie

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir



MAVIRET® PENTRU TRATAMENTUL ȚINTIT AL INFECȚIEI CU VIRUSUL HEPATITEI C

Cu MAVIRET®, medicul dumneavoastră v-a prescris un medicament pentru tratamentul hepatitei C, o boală infecțioasă a ficatului cauzată de virusul hepatitei C (VHC).

MAVIRET® este aprobat pentru tratamentul infecției acute și cronice cu virusul hepatitei C. Hepatita C acută este denumirea bolii apărută în primele șase luni după infectarea cu acest virus. Dacă virusul rămâne în organism și după aceste șase luni, se vorbește despre o evoluție cronică, respectiv despre hepatita C cronică (pe termen lung). Infecția poate fi vindecată atât în stadiul acut, cât și în cel cronic.



Pentru adulți, MAVIRET® este disponibil sub formă de comprimate filmate. Pentru copii cu vârsta de cel puțin trei ani, MAVIRET® este disponibil sub formă de granule filmate. Fiecare comprimat și granulele conțin combinația de substanțe active glecaprevir și pibrentasvir.



MOD DE ACȚIUNE

MAVIRET® este un antiviral cu acțiune directă (Direct-Acting Antiviral, DAA) împotriva tuturor genotipurilor frecvente ale virusului hepatitei C.

- Cu substanțele sale active, inhibă anumite proteine de care virusul are nevoie pentru a se multiplica în ficat.
- Astfel, nu mai poate infecta noi celule hepatice.
- Infecția este combătută eficient, iar virusul hepatitei C este eliminat complet din organism.



REAȚII ADVERSE

Reacțiile adverse foarte frecvente ale MAVIRET® sunt durerea de cap și oboseala.

- Vă rugăm să contactați medicul dumneavoastră sau farmacia dacă prezentați astfel de simptome în timpul tratamentului cu MAVIRET®.
- De asemenea, contactați medicul dumneavoastră sau farmacia dacă observați orice alte manifestări neobișnuite legate de administrarea MAVIRET®.
- De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare din Germania: **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn**



INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE

Interacțiunile MAVIRET® cu alte medicamente sunt rare. Totuși, unele medicamente nu trebuie administrate împreună cu MAVIRET® sau pot fi utilizate doar sub supraveghere medicală.

Înainte de a începe tratamentul cu MAVIRET®, informați medicul dumneavoastră despre ce medicamente utilizați în mod regulat sau ocazional sau ați folosit recent.

Indicați, de asemenea, și preparatele care se eliberează fără rețetă, cum ar fi, de exemplu, sunătoarea. Aceste informații sunt importante pentru medicul dumneavoastră, pentru a vă putea oferi sfaturi corecte.



ANALIZE DE SÂNGE

Înainte, în timpul și după tratamentul cu MAVIRET®, de regulă, vi se va recolta sânge, iar proba va fi analizată în laborator. În baza rezultatelor, medicul dvs. poate:

- decide dacă ar trebui să luați medicamentul;
- stabili durata individuală a medicamentului;
- dovedi că nu mai sunteți purtător de particule ale virusului hepatitei C și că tratamentul a avut succes.



Cu cât o infecție este detectată mai devreme, cu atât mai repede pot fi prevenite leziunile hepatice printr-un tratament țintit.

HEPATITA C: VINDECABILĂ DATORITĂ TERAPIILOR MODERNE

Boala infecțioasă hepatita C este cauzată de virusul hepatitei C (VHC). Virusul pătrunde în organism prin contact cu sângele și se multiplică în celulele ficatului. Netratată, infecția poate afecta grav organul pe măsură ce boala progresează.



HEPATITA C ESTE VINDECABILĂ

Prin terapie precoce și țintită, infecția cu virusul hepatitei C este astăzi vindecabilă în peste 95% din cazuri.

- Tratamentul durează maxim 8-12 săptămâni.
- Terapia este bine tolerată și are puține reacții adverse.
- Pentru un tratament eficient este necesară administrarea zilnică a unui singur comprimat.
- Consumul de alcool, consumul de droguri sau tratamentul de substituție nu afectează terapia.



DEPISTAȚI INFECȚIA DIN TIMP

Primele simptome ale hepatitei C sunt, de obicei, asemănătoare cu cele ale gripei. În unele situații, se pot observa dureri în partea superioară dreaptă a abdomenului.

- Persoanele care doresc să afle dacă există o infecție se pot testa pentru VHC, de exemplu, la cabinetul medicului de familie, la direcția de sănătate publică sau în centrele de consiliere.
- Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate, cu vârsta de 35 de ani sau peste, se pot testa o singură dată pentru hepatita C în cadrul unui control medical general de sănătate (Check-up 35). Costurile pentru acest control medical Check-up 35 sunt, de obicei, acoperite de casele de asigurări de sănătate.



INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA MAVIRET®

Pentru adulți și copii cu vîrsta de peste 12 ani și o greutate corporală de cel puțin 45 kg, se recomandă administrarea zilnică a trei comprimate MAVIRET®, fiecare conținând 100 mg glecaprevir și 40 mg pibrentasvir. Cele trei comprimate sunt ambalate într-un blister. Acestea se administrează împreună, ca doză zilnică.



DURATA INDIVIDUALĂ A TRATAMENTULUI

Durata tratamentului cu MAVIRET® este stabilită de către medicul dumneavoastră. Mulți pacienți iau medicamentul zilnic, timp de 8 săptămâni. În funcție de factorii individuali, terapia poate dura mai mult.



INSTRUCȚIUNI DE ADMINISTRARE

Administrarea corectă a MAVIRET® este importantă pentru succesul terapiei dumneavoastră. Prin urmare, luați întotdeauna medicamentul exact așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. De asemenea, respectați următoarele indicații:

- Luați regulat o dată pe zi trei comprimate MAVIRET® dintr-un blister, pe toată durata tratamentului. Nu omiteți nicio zi de administrare.
- Luați comprimatele MAVIRET® în timpul mesei. Astfel, organismul dumneavoastră poate absorbi în mod optim substanțele active. Nu contează conținutul de grăsimi sau numărul de calorii al mesei.
- Înghițiți comprimatele MAVIRET® întregi. Dacă comprimatele filmate sunt rupte, mestecate, zdrobite sau dizolvate, acest lucru poate afecta absorbția substanțelor active și nivelul de concentrație MAVIRET® din sângele dumneavoastră.



VĂRSĂTURI DUPĂ ADMINISTRARE

Dacă vomitați după administrarea MAVIRET®, acest lucru poate influența cantitatea de substanțe active absorbite din sângele dumneavoastră și poate reduce eficacitatea medicamentului.

Dacă trebuie să luați o doză suplimentară, acest lucru depinde de cât timp a avut corpul dumneavoastră pentru a absorbi substanțele active.

- Luați trei comprimate MAVIRET® ca doză suplimentară dacă ultima administrare a avut loc cu **trei ore sau mai puțin** înainte de momentul în care ați vomitat.
- Nu aveți nevoie de o doză suplimentară dacă au trecut **mai mult de trei ore** de la ultima administrare. Este suficient să vă amintiți să luați următoarea doză obișnuită la ora la care o luați în mod normal.



DOZĂ UITATĂ

Nu luați **niciodată o cantitate dublă** pentru a compensa o doză MAVIRET® omisă. Dacă ar trebui să recuperați o doză, depinde de momentul în care vă dați seama că ați omis doza.

- Luați doza **cât mai curând posibil** dacă vă dați seama că ați uitat să luați comprimatele **în decurs de 18 ore** de la o doză programată. Apoi luați următoarea doză la ora obișnuită.
- **Nu recuperați** doza **dacă** au trecut **18 ore sau mai mult** de la momentul în care trebuia să o luați în mod normal și v-ați dat seama că ați uitat să luați comprimatele. Luați următoarea doză la ora la care o luați în mod normal.



SUPRADOZAJ

Contactați imediat cabinetul medical sau mergeți la spital dacă ați luat o cantitate mai mare decât doza recomandată de MAVIRET®.

Luați cu dumneavoastră ambalajul medicamentului. Astfel, puteți arăta medicului despre ce medicament este vorba.



CAPACITATEA DE A CONDUCE UN AUTOVEHICUL

MAVIRET® nu are efect sau are un efect neglijabil asupra capacității de a participa în siguranță și în mod responsabil la traficul rutier.

Nici capacitatea de a folosi utilaje nu este afectată de medicament.



CONTRACEPȚIE, SARCINĂ, ALĂPTARE

Cereți sfatul medicului cu privire la contracepție, sarcină și alăptare înainte de a lua MAVIRET®.

- Anumite metode de contracepție nu trebuie utilizate concomitent cu MAVIRET®.
- Efectul MAVIRET® în timpul sarcinii nu este cunoscut. Prin urmare, medicamentul nu este recomandat în timpul sarcinii.
- Nu se știe dacă substanțele active ale medicamentului trec în laptele matern.

Informați imediat medicul dumneavoastră dacă rămâneți însărcinată în timpul tratamentului cu MAVIRET®.



DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

Nu există instrucțiuni speciale pentru depozitarea MAVIRET®.

Nu mai utilizați medicamentul după data de expirare. Această dată este indicată pe ambalaj după „A se utiliza până la” („Verwendbar bis”) și pe fiecare blister după „EXP”.



INFORMAȚII SUPLIMENTARE



DESPRE MAVIRET®

Informații despre comprimatele filmate MAVIRET® 100 mg/40 mg pentru tratamentul infecției cu hepatita C găsiți de asemenea pe www.abbvie-care.de/maviret



De asemenea, citiți cu atenție prospectul medicamentului dumneavoastră înainte de a lua MAVIRET®.

Întrebările individuale despre terapia cu MAVIRET® pot fi clarificate în cabinetul medicului dumneavoastră sau la farmacie.



DESPRE HEPATITA C



Cum vă puteți infecta cu hepatita C? Când devine semnificativ un test de depistare a virusului? Ce opțiuni de tratament există și cine vă poate sfătui în legătură cu acestea? Răspunsurile pot fi găsite pe site-ul nostru intern dedicat infecției cu hepatita C:

www.abbvie-care.de/erkrankung/hepatitis-c

De pe site obțineți, de asemenea, sfaturi pentru gestionarea bolii în viața de zi cu zi și puteți descărca gratuit alte broșuri pentru pacienți despre hepatita C.



CEREȚI AJUTOR!

A vorbi despre hepatita C nu este întotdeauna ușor. Totuși, sprijinul și sfaturile altor persoane pot fi foarte utile pentru a face față bolii și terapiei.

În secțiunea „Viața cu hepatita C” de pe www.abbvie-care.de/hepatitis-c găsiți posibilități de contact cu grupuri de sprijin și alte adrese utile.

NOTIȚELE MELE



AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden



natureOffice.gmbh/DE-077-926617

DE-MAVI-260062 Actualizat la 07/26

Notă pentru echipa medicală:

Distribuirea materialelor MAVIRET® către pacienți este permisă, din punct de vedere legal, doar în momentul prescrierii.

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir