

HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

MAVIRET® İLE TEDAVİM

İlaç Hakkında Tüm Önemli
Bilgiler ve Kullanımı.



abbvie

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir



HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİSİ İÇİN MAVIRET®

Doktorunuz MAVIRET® adında, Hepatit C virüsü (HCV) tarafından neden olunan bir karaciğer enfeksiyonu hastalığı olan Hepatit C'nin tedavisi için bir ilaç reçete etmiştir.

MAVIRET®, akut ve kronik Hepatit C enfeksiyonunun tedavisi için onaylanmıştır. Virüsün bulaşmasından sonraki ilk altı ay içindeki hastalığa akut Hepatit C adı verilir. Bu altı ayın sonunda virüs vücutta kalmaya devam ederse buna kronik seyir veya kronik (uzun süreli) Hepatit C adı verilir. Enfeksiyon hem akut hem de kronik aşamada tedavi edilebilir.



Yetişkinler için MAVIRET®, film kaplı tablet formunda mevcuttur. Üç yaşından büyük çocuklar için MAVIRET®, kaplanmış granül formunda mevcuttur. Her bir tablet ve granül, etkin madde kombinasyonu olarak glekaprevir ve pibrentasvir içerir.



ETKİ MEKANİZMASI

MAVIRET®, Hepatit C enfeksiyonuna yol açabilecek tüm yaygın virüs türlerine karşı doğrudan antiviral (Direct-Acting Antiviral, DAA) etki gösterir.

- İçerdiği etken maddeler sayesinde, virüsün karaciğerde çoğalabilmesi için ihtiyaç duyduğu belirli proteinleri engeller.
- Böylece hastalık, artık yeni karaciğer hücrelerini etkileyemez.
- Enfeksiyon etkili bir şekilde tedavi edilir ve Hepatit C virüsü vücuttan tamamen yok edilir.



YAN ETKİLER

MAVIRET®'in en sık görülen yan etkileri baş ağrısı ve yorgunluktur.

- MAVIRET® tedavisi sırasında bu tür şikayetleriniz olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın.
- MAVIRET® kullanımıyla ilgili olarak kendinizde başka herhangi bir değişiklik fark ederseniz de lütfen bizimle iletişime geçin.
- Yan etkileri Almanya'nın ulusal bildirim sistemi aracılığıyla da bildirebilirsiniz:
**Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü, Farmakovijilans Bölümü,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn**



ETKİLEŞİMLER

MAVIRET®'in diğer ilaçlarla etkileşimi nadirdir. Ancak bazı ilaçlar, MAVIRET® ile birlikte kullanılmamalı veya sadece doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Bu nedenle, MAVIRET® tedavisine başlamadan önce düzenli olarak veya ara sıra kullandığınız ya da yakın zamanda kullanmış olduğunuz ilaçları doktorunuza bildirin.

Ayrıca, örneğin sarı kantaron gibi reçetesiz satılan ilaçlar kullanıyorsanız bunları da belirtin. Doktorunuzun size doğru şekilde tavsiyede bulunabilmesi için bu bilgiler önemlidir.



KAN TAHLILLERİ

MAVIRET® tedavisinin öncesinde, tedavi sırasında ve sonrasında genellikle kan alınır ve numuneler laboratuvarında analiz edilir. Sonuçlara göre doktorunuz

- ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine karar verebilir;
- size özel tedavi süresini belirleyebilir ve;
- vücudunuzda artık Hepatit C virüsü partikülleri bulunmadığını ve tedavinin başarılı olduğunu doğrulayabilir.



Enfeksiyon ne kadar erken teşhis edilirse, hedefe yönelik bir tedavi ile karaciğer hasarı o kadar çabuk önlenabilir.

HEPATİT C: MODERN TEDAVİLER SAYESİNDE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Hepatit C adlı bulaşıcı hastalık, HCV tarafından meydana gelir. Virüs, kan yoluyla vücuda girer ve karaciğer hücrelerinde çoğalır. Tedavi edilmezse, enfeksiyon hastalığın seyri boyunca organa ciddi zarar verebilir.



HEPATİT C TEDAVİ EDİLEBİLİR

Erken ve hedefe yönelik bir tedavi ile günümüzde Hepatit C enfeksiyonu vakalarının yüzde 95'inden fazlasında iyileşme sağlanabilmektedir.

- Tedavi genellikle sadece 8 ila 12 hafta sürer.
- Tedavi tolere edilebilir ve yan etkileri azdır.
- Etkili bir tedavi için günde sadece bir kez tablet almak yeterlidir.
- Alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı veya ikame tedavisi görmek, tedaviye engel değildir.



ENFEKSİYONUN ERKEN TEŞHİSİ

Hepatit C'nin ilk belirtileri genellikle grip belirtilerine benzer. Sağ üst karın bölgesinde ağrı da hissedilebilir.

- Enfeksiyon olup olmadığını öğrenmek isteyenler, aile hekimliği muayenehanelerinde, sağlık müdürlüklerinde ve danışma merkezlerinde HCV testi yaptırabilirler.
- Yasal sağlık sigortasına sahip ve 35 yaşında veya daha büyük olan kişiler, genel sağlık muayenesi (Check-up 35) kapsamında tek seferlik Hepatit C testi yaptırabilirler. Bu Check-up 35 muayenesinin masrafları genellikle sağlık sigortaları tarafından karşılanır.

MAVIRET® KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİLER

Vücut ağırlığı en az 45 kg olan yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için günlük doz olarak 100 mg glekaprevir ve 40 mg pibrentasvir içeren üç adet MAVIRET® tableti önerilir. Üç tablet bir blister ambalaj içinde paketlenmiştir. Günlük doz olarak alınır.



KIŞIYE ÖZEL TEDAVİ SÜRESİ

MAVIRET® ile tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenir. Birçok hasta bu ilacı 8 hafta boyunca her gün almaktadır. Kişisel faktörlere bağlı olarak tedavi süresi daha uzun da olabilir.



KULLANIM TALIMATLARI

MAVIRET®'i doğru şekilde kullanmak, tedavinizin başarılı olması için önemlidir. Bu nedenle ilacı daima doktorunuzun size reçete ettiği şekilde kullanın. Ayrıca aşağıdaki uyarıları da dikkate alın:

- edavi süresince **her gün düzenli olarak** bir blisterden üç adet MAVIRET® tableti alın. İlacınızı hiçbir gün atlamayın.
- MAVIRET® tabletlerini **yemekle birlikte** alın. Böylece vücudunuz etken maddeleri en iyi şekilde emebilir. Yiyeceğin ne kadar yağ ve kalori içerdiği önemsizdir.
- MAVIRET®'i **bütün tablet olarak** yutun. Film kaplı tabletler kırılır, çiğnenir, ezilir veya çözülürse, bu durum etken maddenin emilimini ve kanınızdaki MAVIRET® düzeyini etkileyebilir.



İLAÇ ALINDIKTAN SONRA KUSMA

MAVIRET®'i aldıktan sonra kusarsanız bu durum kanınızdaki etken madde miktarını etkileyerek ilacın etkisini azaltabilir.

Bir doz daha almanız gerekip gerekmediği, vücudunuzun etken maddeleri emmek için yeterli zamana sahip olup olmadığına bağlıdır:

- Son ilacı aldığınızdan bu yana **üç saat veya daha az zaman** geçmişse ek bir doz olarak üç adet MAVIRET® tableti alın.
- Son alışınızdan bu yana **üç saatten fazla zaman** geçtiyse başka bir doz almanıza gerek yoktur. O halde, her zamanki saatte bir sonraki normal dozu almayı unutmanız yeterlidir.



DOZU ATLAMA

Atladığınız bir MAVIRET® dozunu telafi etmek için **asla iki katı doz** almayın. Atladığınız dozu telafi etmeniz gerekip gerekmediği, bu durumu ne zaman fark ettiğinize bağlıdır:

- Planlanan alım saatinden itibaren **18 saat içinde** tabletlerinizi almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, dozu derhal **telafi edin**. Bir sonraki dozu yine her zamanki saatte alın.
- Planlanan alım saatinden **18 saat veya daha fazla zaman geçtikten sonra** tabletlerinizi almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bu dozu **almayın**. Bir sonraki dozu her zamanki saatte alın.



DOZ FAZLA ALINMIŞ

MAVIRET®'in trafikte güvenli ve sorumlu bir şekilde araç kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ya da etkisi ihmal edilebilir düzeydedir.

İlaç, makine kullanma yeteneğini de kısıtlamaz.



ARAÇ KULLANMA DURUMU

MAVIRET®'in trafikte güvenli ve sorumlu bir şekilde araç kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ya da etkisi ihmal edilebilir düzeydedir.

İlaç, makine kullanma yeteneğini de kısıtlamaz.



DOĞUM KONTROLÜ, HAMİLELİK, EMZİRME

MAVIRET®'i kullanmadan önce doğum kontrolü, hamilelik ve emzirme konusunda bir doktora danışın.

- Bazı doğum kontrol yöntemleri MAVIRET® ile birlikte kullanılmamalıdır.
- MAVIRET®'in hamilelik sırasında etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle, bu ilaç hamileler için önerilmez.
- İlacın etken maddelerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

**MAVIRET® tedavisi sırasında hamile kalırsanız,
derhal doktorunuza haber verin.**



SAKLAMA KOŞULLARI VE SON KULLANMA TARİHİ

MAVIRET®'in saklanmasıyla ilgili özel bir kural bulunmamaktadır.

Son kullanma tarihi geçmişse ilacı artık kullanmayın. Bu tarih, ambalajın üzerinde "Son Kullanma Tarihi" ifadesinden sonra ve her blister ambalajın üzerinde "EXP" ifadesinden sonra belirtilmiştir.



DAHA FAZLA BILGI



MAVIRET® HAKKINDA

Hepatit C enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan MAVIRET® 100 mg/40 mg film kaplı tabletler hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste de bulabilirsiniz: www.abbvie-care.de/maviret



Ayrıca, MAVIRET® kullanmadan önce ilacınızın kullanım kılavuzunu (kutu içi prospektüsü) dikkatlice okuyun.

MAVIRET® ile tedaviye ilişkin kişisel sorularınızı doktorunuzun muayenehanesinde veya eczanenizde netleştirebilirsiniz.



HEPATIT C HAKKINDA



Hepatit C nasıl bulaşır? Virüs testi ne zaman anlamlı sonuçlar verir? Hangi tedavi seçenekleri bulunur ve bu konuda kimden bilgi alınabilir? Hepatit C enfeksiyonu ile ilgili sorularınızın yanıtlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz:

www.abbvie-care.de/erkrankung/hepatitis-c

Bu sayfada, hastalıkla günlük yaşamda başa çıkmaya yönelik ipuçları bulabilir ve Hepatit C ile ilgili diğer hasta broşürlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



DESTEK ALIN!

Hepatit C hakkında konuşmak her zaman kolay değildir. Ancak başkalarından gelen destek ve tavsiyeler, hastalıkla başa çıkma ve tedavi sürecinde çok yararlı olabilir.

www.abbvie-care.de/hepatitis-c adresindeki “Hepatit C ile Yaşamak” bölümünde, kendi kendine yardım gruplarıyla iletişime geçme yolları ve diğer faydalı adresleri bulabilirsiniz.

NOTLARIM

abbvie

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden



natureOffice.gmbh/DE-077-926617

DE-MAVI-260064 Geçerlilik başlangıcı 07/26

Tedavi ekibi için not:

MAVIRET® ürünlerinin hastalara verilmesi, yasal olarak ancak reçete düzenlendiği zaman yapılabilir.

MAVIRET® 
Glecaprevir/Pibrentasvir